

**BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA****Carbosan szájnyalvakahártyán alkalmazott gél  
karbenoxolon-nátrium**

**Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.**

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő alkalmazása.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen forduljon orvosához, ha tünetei 14 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

**A betegtájékoztató tartalma:**

1. Milyen típusú gyógyszer a Carbosan gél és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Carbosan gél alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Carbosan gél?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Carbosan gél tárolni?
6. További információk

**1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A CARBOSAN GÉL ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?**

A Carbosan gél az ajakfájdalmak - pl. láz kiváltotta, herpeszvírus okozta gyulladás -, valamint szájnyalvakahártya-fekély tüneteinek enyhítésére és kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény. Rövid időn belül csökkenti a fájdalmat és elősegíti a természetes gyógyulási folyamatot.

**2. TUDNIVALÓK A CARBOSAN GÉL ALKALMAZÁSA ELŐTT****Ne alkalmazza a Carbosan gél**

- ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagra vagy a Carbosan gél egyéb összetevőjére.
- bizonyos bőr- és nyálkahártya daganatok és nemi betegségek esetén
- a készítmény nem alkalmazható súlyos szív-, vese- és májkárosodás, magas vérnyomás, egyidejű szívglükózid kezelés (szívpanaszok esetén alkalmazott gyógyszer), alacsony szérumalbumin szint esetén,
- 3 éves kor alatt
- idős korban.

**A Carbosan gél fokozott elővigyázatossággal alkalmazható**

Bakteriális felülfertőzés esetén a megfelelő kezelést kell alkalmazni. Ebben az esetben forduljon kezelő orvosához.

Az önmagában alkalmazott helyi terápia a Carbosan géllal elégtelen lehet immunrendszeri gyengeség, ill. az immunműködés gyógyszeres gátlása (pl. szervtranszplantáció) esetében.

**A kezelés ideje alatt alkalmazott egyéb gyógyszerek**

Feltétlenül tájékoztassa kezelő orvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is.

A Carbosan gél egyidejű szívglükozid kezelés (bizonyos szívbetegségek kezelésére adott gyógyszerek) esetén nem alkalmazható.

**Terhesség és szoptatás**

Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelő orvosával vagy gyógyszerészével. A hatóanyag magzatkárosító hatását nem észlelték, mindazonáltal a Carbosan gél nem alkalmazható a terhesség első harmadában vagy szoptatás ideje alatt.

**A készítmény hatásai a gépjármű vezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre**

Ezeket a képességeket a készítmény nem befolyásolja.

**3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A CARBOSAN GÉLT?**

A Carbosan gél mindig az elírásnak megfelelően alkalmazza. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét. Kizárólag külsőleg, helyileg alkalmazható.

A készítmény szokásos adagja: a géllal naponta 4 alkalommal, vastagon kell bekenni az érintett bőrről, ill. szájnyálkahártya felületet, lehetőleg étkezések után és lefekvéskor. A gél az ajakfájdalom vagy szájüregi fekély első tüneteinek jelentkezésekor (bizsergés vagy égő érzés) célszerű alkalmazni és a lehető legtovább kell az érintett területen hagyni.

Alkalmazás után a kupakot minden esetben szorosan vissza kell csavarni.

Amennyiben tünetei 2 hét után nem szűnnek meg, keresse fel kezelő orvosát.

**Ha az elírásnál több Carbosan gél alkalmazott**

Elírás szerinti alkalmazás esetén túladagolást nem észleltek.

Gyermekek esetén figyelni kell arra, hogy nagy mennyiségű gél ne nyeljenek le, mivel lenyelve étvágy- és anyagcserezavarokat, valamint vérnyomásemelkedést okozhat.

**Ha elfelejtette alkalmazni a carbosan gél**

Ne alkalmazzon dupla adagot az elfelejtett adag pótlására.

A következő adagot alkalmazza a megszokott időpontban.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

**4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK**

Alkalmazása során mellékhatásokról nem számoltak be.

Ha mellékhatást, illetve egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

**5. HOGYAN KELL A CARBOSAN GÉLT TÁROLNI?**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Legfeljebb 25 °C -on tárolandó!

A csomagoláson feltüntetett lejárati idő (hó, év, Exp. date) után ne alkalmazza a Carbosan gél. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy szükségtelemné vált gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések el segítik a környezet védelmét.

## 6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

### Mit tartalmaz a Carbosan gél?

- A készítmény hatóanyaga: 20.8 mg karbenoxolon-nátrium grammonként.
- Egyéb összetev k: Polyol-zsírsv-észter (CETIOL HE), citromolaj, imidurea (BIOPURE 100), nipasztát-nátrium (metil-,etil-, propil-, butil-parahidroxibenzoát nátrium sója), izo-oktil-sztearát (CETIOL 868), polioxil-30-cetosztearil-alkohol (EMUGIN B.3.), tisztított víz.

### Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás

Kb. 5 g töltöttömeg gél fehér, PP, lyukasztóval ellátott, csavaros kupakkal és alumínium fóliával lezárt, kék alumínium tubusban. 1 tubus dobozban.

### A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó:

Rowa Pharmaceuticals Ltd.  
Newtown  
Bantry, Co.Cork  
Írország

OGYI-T- 8529/01

**A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2008. 04. 23.**